

# ประวัติอำเภอเทพารักษ์

# วัดคอยเจดีย์

# โครงการไฟฟ้าพลังงานลม

## ความรู้และกิจกรรมต่างในเครือข่ายสุขภาพของอำเภอเทพารักษ์ ในรูปแบบONE PAGE

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์  
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

20 พ.ค.22 เวลา 14.30 น. บุคลากรของ โรงพยาบาลเทพารักษ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การป้องกัน การดูแล และการรักษา COVID-19 ที่ โรงพยาบาลเทพารักษ์ โดยมี นพ.ชาญชัย บุญสูงเนิน นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในการประชุม

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคและการสาธารณสุข  
COVID-19 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น.

ผู้ป่วยสงสัย	ผู้ป่วยยืนยัน	ผู้ป่วยเสียชีวิต
0 ราย	0 ราย	0 ราย

ประเภทสถานพยาบาล	ประเภทคลินิก/ชุมชน
<p>ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด: 18 ราย</p> <p>ผู้ป่วยยืนยันที่อำเภอเทพารักษ์: 0 ราย</p> <p>ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ออกใบรับรองแพทย์: 0 ราย</p> <p>ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ออกใบรับรองแพทย์: 0 ราย</p>	<p>ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด: 530 ราย</p> <p>ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ออกใบรับรองแพทย์: 0 ราย</p> <p>ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ออกใบรับรองแพทย์: 0 ราย</p> <p>ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ออกใบรับรองแพทย์: 0 ราย</p>

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

ชาย	หญิง	รวม	เสียชีวิต
383	178	561	143

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคและการสาธารณสุข  
COVID-19 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานการณ์การเสียชีวิตจาก COVID-19

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 08.00 - 10.00 น. และ เวลา 15.00 - 18.00 น.

ประเภท	จำนวน
ชาย	จำนวน 281 คน
หญิง	จำนวน 204 คน

เสียชีวิตจากชุมชน	75.55 %
เสียชีวิตจากสถานพยาบาล	24.45 %

เสียชีวิตจากชุมชน	83.53 %
เสียชีวิตจากสถานพยาบาล	16.47 %



หมอบรรณครวี  
หมอบรรณครวี



กลุ่มงานสารสนเทศ  
งานสารสนเทศ



โรงพยาบาลเทพารักษ์  
โรงพยาบาลแม่  
ข่ายCUPเทพารักษ์



โรงพยาบาลด่านขุนทด  
เว็บไซต์หน่วยงานเพื่อนบ้าน  
www.dkthos.com

## ข่าวCovid19

## กิจกรรม ป้องกันโรคติดต่อ

รู้ทันโรคโควิด-19 (COVID-19)

เช็กความเสี่ยงกับอาการ

- ✓ อาการ COVID-19 จะคล้ายกับไข้หวัด
- ✓ อาการของโรคจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่สัมผัสกับไวรัส โดยส่วนใหญ่จะพบในช่วง 2-14 วันหลังสัมผัส
- ✓ อาการของโรคจะคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา
- ✓ อาการของโรคจะคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา

โรคโควิด-19 มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้

โรคโควิด-19 มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้

รู้ทันโรคโควิด-19 (COVID-19) ตอน 2

ระยะของโรคโควิด-19 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

- ระยะที่ 1: ผู้ป่วยมีอาการไข้
- ระยะที่ 2: ผู้ป่วยมีอาการไอ
- ระยะที่ 3: ผู้ป่วยมีอาการหายใจลำบาก

การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19

การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19

โรคโควิด 19

โรคติดต่ออันตราย 3 วันแรกถึงขั้นเสียชีวิต!

กลุ่มเสี่ยง

- ผู้สูงอายุ
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว
- ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับหัวใจ
- ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับไต
- ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับตับ

อาการ

- ไข้สูง
- ไอ
- หายใจลำบาก
- อ่อนเพลีย
- เจ็บคอ
- ปวดศีรษะ
- ปวดเมื่อย
- ท้องเสีย
- ผื่นขึ้น

การป้องกัน

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวที่อาจมีเชื้อ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคน

เตือน! 11 ประเด็น